

## ნუმის სეზონური სქემა, ელექსირი

### დაავადებების და მწერების გავრცელების პრევენცია

#/#	განვითავების სტადია	მავნე ობიექტი	შესაწამლი ხსნარი		
			ელექსირი	პრეპარატი, ლ/ჰა	წყალი, ლ/ჰა
1	კვირტების დაბერვამდე (მოსვენების პერიოდი)	ფარიანები, ატმის დიდი ბუგრები, ტკიპები, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, ტოტების ხმობა, გუმოზი	ხილისთვის, კაკლოვანი და კენკროვანი კულტურებისთვის	5	600
2	ვარდისფერი კონუსი	კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, ტოტების ხმობა, გუმოზი		5	600
3	უშუალოდ ყვავილობის წინ, რამდენიმე ყვავილი გაშლილია	კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, გუმოზი, ატმის დიდი ბუგრი		10	600
4	დაყვავილების შემდეგ ნაყოფის ფორმირებისას	კლასტეროსპორიოზი, გუმოზი, ჟანგა, ბუგრები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები		10	600
5	ნაჭუჭის გამაგრებისას	კლასტეროსპორიოზი, გუმოზი, ტოტების ხმობა, ჟანგა, ატმის დიდი ბუგრი		10	600