

ქლიავი - სეზონური სქემა, ელექსირი

დაავადებების და მწერების გავრცელების პრევენცია

#/#	განვითაების სტადია	მავნე ობიექტი	შესაწამლი ხსნარი		
			ელექსირი	პრეპარატი, ლ/ჰა	წყალი, ლ/ჰა
1	კვირტის დაბერვა	კლასტეროსპორიოზი, სოკოვანი დაავადებები	ხილისთვის, კაკლოვანი და კენკროვანი კულტურებისთვის	5	600
2	ყვავილობის დასაწყისი	კლასტეროსპორიოზი, პოლისტიგმოზი, მონილიოზი, მწუწნი მწერები		5	600
3	ყვავილობის დასასრულის შემდეგ 5 დღეში	კლასტეროსპორიოზი, პოლისტიგმოზი, ბუგრები, ხერხიები		10	600
4	წინა წამლობიდან ორი კვირის შემდეგ.	სოკოვანი დაავადებები, ნაყოფჭამიები		10	600
5	წინა წამლობიდან ორი კვირის შემდეგ.	სოკოვანი დაავადებები, ნაყოფჭამიები		10	600
6	წინა წამლობიდან ორი კვირის შემდეგ.	სიდამპლეები, პოლისტიგმოზი, ნაყოფჭამიები		10	600
7	მოსავლის აღების შემდეგ	კლასტეროსპორიოზი, ქლიავის ნაყოფჭამია		10	600